



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note technique 2025



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
MÉDITERRANÉEN

Demande de dérogation de spécimens d'espèces végétales protégées pour la récolte, l'utilisation, le transport et la cession

Article L.411 – Code de l'Environnement



Résumé

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBNMed), a été créé par arrêté du 15 février 1979 par le Ministère en charge de la transition écologique. Agréé le 9 avril 1990 par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, il est rattaché à l'établissement public administratif du Parc national de Port-Cros qui en assure la gestion.

Ses missions sont définies à l'article R. 416-1 du code de l'environnement.

Les principales sont le développement de la connaissance et l'évaluation de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats naturels ; la gestion, diffusion et valorisation des données ; la conservation des éléments rares et menacés ; l'expertise auprès des services de l'Etat et des collectivités territoriales ; l'information et la sensibilisation du public sur ces thématiques, à l'échelle du bassin méditerranéen continental français.


L'ensemble du territoire d'agrément du CBNMed représente une superficie de 47.000 km² et s'organiser sur 2 régions.

Les Départements concernés pour la Région PACA sont :

-  Alpes-Maritimes (06) ;
-  Var (83) ;
-  Bouches-du-Rhône (13) ;
-  Vaucluse (84).

Les Départements concernés pour la Région Occitanie sont :

-  Gard (30) ;
-  Hérault (34) ;
-  Lozère (48) ;
-  Aude (11) ;
-  Pyrénées-Orientales (66).



Au titre des différentes missions de l'agrément, les agents du CBNMed sont amenés à collecter du matériel végétal sur des espèces patrimoniales, y compris sur des espèces bénéficiant d'un statut de protection nationale, régionale ou départementale.


Dans cet objectif et afin de pouvoir mener à bien ses missions d'intérêt général au service de la flore et de la faune, tout en respectant le cadre de la réglementation sur les espèces protégées, le CBNMed dépose une demande de dérogation à l'interdiction de récolte, de transport, d'utilisation et de cession de spécimens d'espèces végétales protégées sur son territoire d'agrément.

Cette demande est formulée conjointement au dépôt de demande de renouvellement d'agrément pour la période 2026-2036.

Cette note vise à présenter les activités du CBNMed conduites en lien avec la réglementation espèces protégées.

Sommaire

NATURE ET BILAN DES ACTIVITÉS CONCERNÉES	5
Présentation des activités en lien avec la demande de dérogation.....	5
La banque de semences	6
Les herbiers du conservatoire	7
DEMANDE DE DÉROGATION 2026 - 2035	8
Nature des activités concernées	8
Espèces concernées.....	9
Personnes concernées.....	9
Territoire.....	9
Durée	11
Bilan, suivi et perspectives	11
ANNEXES.....	12
Annexe 1 : Liste des 365 taxons à statut (protection nationale, régionale ou départementale) récoltés et conservés au moins une fois au CBNMed depuis 1975.....	12
Annexe 2 : Liste des taxons à statut conservés en herbier par le CBNMed	18



NATURE ET BILAN DES ACTIVITÉS CONCERNÉES

De par ses missions d'intérêt général, les agents du CBNMed sont amenés à manipuler des espèces végétales protégées. Cette partie a pour vocation de présenter toutes les activités nécessitant une autorisation pour la récolte, l'utilisation, le transport et la cession des espèces végétales protégées.

Présentation des activités en lien avec la demande de dérogation

Les principales activités qui sont concernées par la réglementation sont :

- La détermination taxonomique d'individus ;
- La récolte, la manipulation, la détention et l'usage des semences ;
- La collecte et la détention de spécimens pour les collections d'herbier ;
- Le prélèvement à des fins scientifiques (analyses génétiques, cytologiques).

Les activités de conservation du CBNMed ont été développées progressivement, avec la stratégie de conservation de la flore vasculaire et le lien étroit qui est maintenu entre les activités de conservation *in situ* et *ex situ*.

Cette vision permet une approche globale de la conservation des espèces (réglementaire, meilleure gestion, amélioration des connaissances à partir de l'étude de la germination des semences) qui est adaptée à chaque cas en fonction des enjeux et des besoins. Ainsi la conservation *ex situ* vient en appui à la conservation *in situ*.

La banque de semences

Le Centre de conservation *ex situ* du CBNMed (banque de semences et unité de culture) se situe dans le Var, sur la commune d'Hyères, sur l'île de Porquerolles. Il a vu le jour dès les prémices de l'émergence du CBNMed, avec la première récolte de graines à vocation de conservation en 1975.

L'expertise du CBNMed est d'un intérêt majeur dans la conservation et la restauration des espèces rares et menacées de par son retour d'expérience sur la germination et la conservation sur de nombreuses espèces.

La priorité du CBNMed s'oriente sur la conservation des éléments rares et menacés de notre territoire d'agrément. Les récoltes sont orientées de 3 manières :

- Par des programmes spécifiques,
- Par la mise en œuvre des missions d'intérêt général : feuille de route annuelle de taxons à fort enjeux de conservation à récolter (nouvelles récoltes ou renouvellement de lots),
- Par opportunisme dans le cadre de prospections de terrain : taxon à maturité dont les conditions de germination ne sont pas ou peu connues.

Les graines sont récoltées dans le milieu naturel puis triées, nettoyées et conservées à l'aide d'équipements de pointe, dédiés à cet usage.

La banque de semences permet de conserver la biodiversité végétale et de constituer une assurance pour le maintien des espèces et des populations (opérations de renforcement et de réintroduction pour les espèces les plus menacées de disparition).

Les semences anciennes ont également un intérêt pour le monde de la recherche avec les études sur l'écologie de la résurrection permettant **d'étudier l'adaptation des plantes face aux changements globaux.**

Les opérations de renforcement ou de réintroduction font et feront toujours l'objet de demandes de dérogation spécifiques et n'entrent pas dans le cadre de la présente demande de dérogation à la récolte de spécimen.

La banque de semences du CBNMed abritent actuellement plus de 2 093 taxons représentant 9 727 récoltes, 9 702 accessions (lots) et près de 13 782 stockages actifs :

-  Chambre froide : 5 060 stockages
-  Lyophilisation : 7 430 stockages
-  Congélation : 847 stockages
-  Dessiccateur (en attente de mise en conservation) : 201 récoltes

Ces semences conservées ont permis d'obtenir plus de 8 925 données de germination.

L'annexe 1 présente la liste des taxons à statut conservés actuellement au moins une fois dans la banque de semences du CBNMed depuis sa création.

Les herbiers du conservatoire

Le CBNMed possède un herbier à Hyères pour la flore vasculaire, la bryoflore, la fonge et les algues.

Cet herbier, référencé sous le code international HYE se compose actuellement d'environ 14 000 parts d'herbier (issues de récoltes des agents du CBNMed, mais aussi de dons de la part de nos partenaires). Ils représentent un total de plus 4 700 taxons, dont 311 possèdent un statut réglementaire. Ils concernent majoritairement la flore vasculaire.

L'herbier est une ressource scientifique indispensable à la qualité scientifique des démarches de connaissance et de conservation de la flore. Il appuie par une preuve matérielle les observations stockées dans le système d'information. C'est un outil de travail essentiel pour le CBNMed, il aide à l'étude de taxons complexes, il permet des contrôles d'identification a posteriori, en particulier pour des taxons appartenant à des groupes difficiles. Le développement des analyses génétiques, des mesures cytologiques et de la systématique moléculaire, impose par ailleurs d'associer systématiquement une part d'herbier à chaque échantillon analysé.

L'annexe 2 présente la liste des taxons à statut conservés en herbier par le CBNMed depuis sa création.



DEMANDE DE DÉROGATION 2026 - 2035

La demande porte sur toutes les activités conduites en tant que Conservatoire botanique national. Elle ne concerne pas les activités de renforcement / réintroduction / introduction d'espèces dans le milieu naturel qui doivent faire l'objet d'une demande de dérogation spécifique.

Nature des activités concernées

Les activités concernées sont :

- La récolte d'organes végétatifs et reproducteurs (tiges, feuilles, fleurs, thalles, capsules, diaspores), en vue d'une conservation en banque de semences, ou en jardin conservatoire (exceptionnellement arrachage d'individus entiers) ;
- Le prélèvement de tout ou partie de spécimens pour vérification de l'identification et étude taxonomique ;
- Le prélèvement non destructeur de matériel adapté pour la réalisation d'étude génétique ;
- La détention de spécimens en collections d'herbiers issues de collectes réalisées par le personnel du CBNMed ;
- La détention de spécimens en collections d'herbiers provenant de dons et dépôts de personnes morales, publiques ou privées, ou physiques, comprenant des spécimens d'espèces protégées collectés avant la mise en place de la réglementation ou après mais sans les autorisations nécessaires.

Parmi ces activités, celles les plus pratiquées sont la récolte de semences pour la conservation en banque de semences et les prélèvements en vue de détermination et de mise en herbier (souvent le même prélèvement à 2 vocations).

Espèces concernées

La présente demande de dérogation à l'interdiction de récolte, de transport d'utilisation ou de cession de spécimens d'espèces protégées (flore vasculaire, bryoflore, fonge) porte sur **l'ensemble des espèces protégées inscrites sur les listes réglementaires au niveau national, régional ou départemental du territoire d'agrément.**

Dans une optique de mise en conformité avec la réglementation en vigueur, de simplification administrative et de sécurité juridique de nos activités, **toutes les espèces protégées de France métropolitaine** font également l'objet de la présente demande.

Cette précaution est nécessaire en cas de découverte de nouvelles espèces protégées sur notre territoire, jusqu'à lors méconnues. Ainsi, le CBNMed pourra réaliser ses missions d'intérêt général de connaissance et de conservation sur ces espèces.

De plus, il s'agit aussi d'assurer la bonne sécurité juridique de nos activités en lien avec le réseau des conservatoires botaniques nationaux.

Personnes concernées

La demande de dérogation à la protection des espèces formulée par le CBNMed a pour objectif de couvrir les activités de l'ensemble des agents scientifiques et techniques du Conservatoire, y compris ceux sous contrat temporaire, pour toute la durée de l'agrément (2026-2035), et ce, sous la responsabilité du Directeur délégué du CBNMed.

Territoire

La demande est faite pour l'ensemble du territoire d'agrément du Conservatoire botanique national Méditerranéen, soit près de 47.000 km² répartis sur 2 régions :


Les Départements concernés pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont :

-  Alpes-Maritimes (06) ;
-  Var (83) ;
-  Bouches-du-Rhône (13) ;
-  Vaucluse (84).

Les Départements concernés pour la Région Occitanie sont :

-  Gard (30) ;
-  Hérault (34) ;
-  Lozère (48) ;

- Aude (11) ;
- Pyrénées-Orientales (66).



Sur son territoire d'agrément, le CBNMed est amené à travailler sur le territoire de 4 parcs nationaux (PN) :

- PN du Mercantour
- PN de Port-Cros
- PN des Calanques
- PN des Cévennes

Mais aussi sur le territoire de Réserves Naturelles Nationales (RNN) :

Dont 14 en Occitanie :

- RNN de la Vallée d'Eyne
- RNN de Prats-de-Mollo-la-Preste
- RNN de Py
- RNN de Mantet
- RNN de Conat
- RNN de Nohèdes
- RNN de Jujols
- RNN de la Grotte du T.M. 71
- RNN de la Forêt de la Massane
- RNN du Mas Larrieu

-  RNN de Roque Haute
-  RNN du Bagnas
-  RNN de l'Estagnol
-  RNN des Gorges de l'Ardèche

Et 6 en Provence-Alpes-Côte d'Azur :

-  RNN de la Camargue
-  RNN des Marais du Vigueirat
-  RNN des Coussouls de Crau
-  RNN Géologique du Luberon
-  RNN de la Sainte-Victoire
-  RNN de la Plaine des Maures

Il serait nécessaire que la présente demande d'autorisation de prélèvements végétaux dans le cadre des missions d'intérêt général au service de la flore, de la bryoflore et de la fonge soit également effective sur ces territoires.

Durée

Il est attendu une autorisation L.411 en cohérence avec la durée du nouvel agrément du Conservatoire soit 2026-2035, afin de s'inscrire au plus près du projet d'établissement. Un bilan à mi-parcours pourra être établi si nécessaire.

Bilan, suivi et perspectives

Un bilan annuel des prélèvements sera à disposition des services de l'État sur demande.



ANNEXES

Annexe 1 : Liste des 365 taxons à statut (protection nationale, régionale ou départementale) récoltés et conservés au moins une fois au CBNMed depuis 1975.

Nom complet du taxon
<i>Acanthoprasium frutescens</i> (L.) Spenn., 1843
<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005
<i>Acis fabrei</i> (Quézel & Girerd) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004
<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoïno) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004
<i>Adonis pyrenaica</i> DC., 1815
<i>Adonis vernalis</i> L., 1753
<i>Aira provincialis</i> Jord., 1852
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Coss. & Durieu, 1855
<i>Alcea biennis</i> Winterl., 1788
<i>Alkanna lutea</i> A.DC., 1846
<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753
<i>Allium commutatum</i> Guss., 1855
<i>Allium moly</i> L., 1753
<i>Allium nigrum</i> L., 1762
<i>Allium savii</i> Parl., 1857
<i>Allium siculum</i> Ucria, 1793
<i>Allium subhirsutum</i> L., 1753
<i>Althenia filiformis</i> subsp. <i>filiformis</i> Petit, 1829

<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894
<i>Anagyris foetida</i> L., 1753
<i>Androsace elongata</i> L., 1763
<i>Anemone coronaria</i> L., 1753
<i>Anemone palmata</i> L., 1753
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv., 1806
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L., 1753
<i>Anthyllis cytisoides</i> L., 1753
<i>Antirrhinum tortuosum</i> Bosc ex Lam., 1797
<i>Aquilegia hirsutissima</i> Lapeyr. ex Timb.-Lagr., 1872
<i>Arenaria cinerea</i> DC., 1815
<i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840
<i>Arenaria modesta</i> Dufour, 1821
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & G.Halliday, 1964
<i>Armeria belgenciensis</i> Donad. ex Kerguelen, 1987
<i>Armeria malinvaudii</i> H.J.Coste & Soulié, 1911
<i>Armeria ruscinnensis</i> Girard, 1844
<i>Armeria ruscinnensis</i> subsp. <i>ruscinnensis</i> Girard, 1844

<i>Artemisia molinieri</i> Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill., 1768
<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy, 1913
<i>Asplenium sagittatum</i> (DC.) Bange, 1952
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753
<i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC., 1805
<i>Astragalus alopecuroides</i> L., 1753
<i>Astragalus echinatus</i> Murray, 1770
<i>Astragalus glaux</i> L., 1753
<i>Astragalus tragacantha</i> L., 1753
<i>Atractylis cancellata</i> L., 1753
<i>Atractylis humilis</i> L., 1753
<i>Bassia laniflora</i> (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978
<i>Bellevia romana</i> (L.) Sweet, 1826
<i>Bellevia trifoliata</i> (Ten.) Kunth, 1843
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord., 1864
<i>Biserrula epiglottis</i> (L.) Coulot, P.Rabaute & J.-M.Tison, 2014
<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753
<i>Brassica montana</i> Pourr., 1788
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC., 1821
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) Heywood, 1964
<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I.M.Johnst., 1954
<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>permixta</i> (Jord.) L.Cecchi & Selvi, 2014
<i>Bupleurum semicompositum</i> L., 1756
<i>Calla palustris</i> L., 1753
<i>Campanula albicans</i> (Buser) Engl., 1897
<i>Cardamine asarifolia</i> L., 1753
<i>Carduus acicularis</i> Bertol., 1829
<i>Carex cespitosa</i> L., 1753
<i>Carex griquetii</i> Roem., 1806
<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr, 1801
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784
<i>Carex limosa</i> L., 1753
<i>Carex olbiensis</i> Jord., 1846
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753
<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811
<i>Carlina acanthifolia</i> All., 1773
<i>Carthamus caeruleus</i> L., 1753
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourr., 1788

<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguelen, 1998
<i>Centaurea pseudocineraria</i> (Fiori) Rouy, 1904
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
<i>Cephalaria transylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
<i>Cerastium siculum</i> Guss., 1832
<i>Ceratonia siliqua</i> L., 1753
<i>Chaerophyllum nodosum</i> (L.) Crantz, 1767
<i>Chaetonympha cymosa</i> (L.) Sweet, 1839
<i>Chamaerops humilis</i> L., 1753
<i>Chiladenus glutinosus</i> (L.) Fourr., 1869
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753
<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Soldano, 1994
<i>Cistus crispus</i> L., 1753
<i>Cistus populifolius</i> L., 1753
<i>Cistus pouzolii</i> Delile, 1839
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng, 1934
<i>Cneorum tricocon</i> L., 1753
<i>Colchicum filifolium</i> (Cambess.) Stef., 1926
<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr., 1792
<i>Convolvulus lineatus</i> L., 1759
<i>Convolvulus siculum</i> L., 1753
<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753
<i>Corispermum gallicum</i> Iljin, 1929
<i>Coronilla securidaca</i> L., 1753
<i>Coronilla valentina</i> L., 1753
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr., 1788
<i>Cosentinia vellea</i> (Aiton) Tod., 1866
<i>Cosentinia vellea</i> subsp. <i>vellea</i> (Aiton) Tod., 1866
<i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier, 1923
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827
<i>Crepis dioscoridis</i> L., 1763
<i>Cressa cretica</i> L., 1753
<i>Crocus ligusticus</i> Mariotti, 1988
<i>Crucianella maritima</i> L., 1753
<i>Cutandia maritima</i> (L.) Benth., 1881
<i>Cyclamen balearicum</i> Willk., 1875
<i>Cyperus capitatus</i> Vand., 1771
<i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753
<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm., 1866
<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768

<i>Damasonium polyspermum</i> Coss., 1849
<i>Danthonia alpina</i> Vest, 1821
<i>Daphne mezereum</i> L., 1753
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb., 1898
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1801
<i>Delphinium verdunense</i> Balb., 1813
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753
<i>Dichoropetalum schottii</i> (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov, 2007
<i>Dictamnus albus</i> L., 1753
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik., 1790
<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753
<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss., 1840
<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenk. & Reichst., 1975
<i>Echinophora spinosa</i> L., 1753
<i>Elatine macropoda</i> Guss., 1827
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski, 1936
<i>Elytrigia elongata</i> subsp. <i>elongata</i> (Host) Nevski, 1936
<i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>distachya</i> L., 1753
<i>Erinacea anthyllis</i> Link, 1831
<i>Erodium rodiei</i> (Braun-Blanq.) Poirion, 1964
<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753
<i>Eryngium spinalba</i> Vill., 1779
<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill., 1786
<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753
<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>minor</i> (Duby) Wilczek, 1917
<i>Euphorbia terracina</i> L., 1762
<i>Euphorbia vallinoana</i> Belli, 1904
<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu, 1898
<i>Fritillaria montana</i> Hoppe, 1832
<i>Gagea pomoranica</i> R.Ruthe, 1893
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826
<i>Galium minutulum</i> Jord., 1846
<i>Galium trifidum</i> L., 1753
<i>Galium verrucosum</i> Huds., 1767
<i>Genista linifolia</i> L., 1762
<i>Genista lobelii</i> DC., 1805
<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet, 1956
<i>Gentiana lutea</i> L., 1753
<i>Geranium lanuginosum</i> Lam., 1788
<i>Geum hispidum</i> Fr., 1817

<i>Gladiolus dubius</i> Guss., 1832
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753
<i>Hedysarum boutignyanum</i> (A.Camus) Alleiz., 1928
<i>Hedysarum boveanum</i> subsp. <i>europaeum</i> Guitt. & Kerguélen, 1991
<i>Hedysarum spinosissimum</i> L., 1753
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill., 1768
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC., 1805
<i>Helianthemum marifolium</i> Mill., 1768
<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum.Cours., 1802
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> (Roth) G.Don, 1830
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>serotinum</i> (Boiss.) P.Fourn., 1939
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794
<i>Heliotropium supinum</i> L., 1753
<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>inodora</i> (L.) P.Fourn., 1936
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv., 1817
<i>Hibiscus palustris</i> L., 1753
<i>Holosteum breistrofferi</i> Greuter & Charpin, 1971
<i>Hormathophylla ligustica</i> (Breistr.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold, 2015
<i>Hormathophylla pyrenaica</i> (Lapeyr.) Dudley & Cullen, 1965
<i>Hormathophylla saxigena</i> (Jord. & Fourr.) D.A.German & Govaerts, 2015
<i>Hormathophylla spinosa</i> (L.) P.Küpfer, 1974
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm., 1944
<i>Hyoseris scabra</i> L., 1753
<i>Hypocoum procumbens</i> L., 1753
<i>Iberis nana</i> All., 1789
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch., 1797
<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763
<i>Inula britannica</i> L., 1753
<i>Inula helenioides</i> DC., 1815
<i>Ionopsidium glastifolium</i> (L.) M.Koch, 2012
<i>Iris graminea</i> L., 1753
<i>Iris tuberosa</i> L., 1753
<i>Iris xiphium</i> L., 1753
<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

<i>Juncus balticus</i> subsp. <i>pyrenaeus</i> (Timb.-Lagr. & Jeanb.) P.Fourn., 1935
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC., 1838
<i>Kalmia procumbens</i> (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005
<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch, 1897
<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897
<i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961
<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753
<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753
<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill., 1916
<i>Leucojum aestivum</i> L., 1759
<i>Leucojum pulchellum</i> Salisb., 1807
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass., 1823
<i>Lilium martagon</i> L., 1753
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss., 1848
<i>Limonium cuspidatum</i> (Delort) Erben, 1978
<i>Limonium girardianum</i> (Guss.) Fourr., 1869
<i>Limonium pseudominutum</i> Erben, 1988
<i>Loeflingia hispanica</i> L., 1753
<i>Loncomelos pyrenaicum</i> (L.) L.D.Hrouda, 1988
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot., 1800
<i>Lotus tetragonolobus</i> L., 1753
<i>Lysimachia ephemerum</i> L., 1753
<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753
<i>Lythrum borysthenticum</i> (Schrank) Litv., 1917
<i>Lythrum thesioides</i> M.Bieb., 1808
<i>Lythrum thymifolia</i> L., 1753
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878
<i>Malva punctata</i> (L.) Alef., 1862
<i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M.Monts., 2005
<i>Marsilea strigosa</i> Willd., 1810
<i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire, 1932
<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) W.T.Aiton, 1812
<i>Medicago polyceratia</i> (L.) Trautv., 1841
<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>glomerata</i> (Balb.) Rouy, 1899
<i>Medicago secundiflora</i> Durieu, 1845
<i>Melilotus messanensis</i> (L.) All., 1785
<i>Mentha cervina</i> L., 1753
<i>Milium montianum</i> Parl., 1850
<i>Moehringia intermedia</i> (Loisel.) Panizzi, 1889

<i>Moehringia lebrunii</i> Merxm., 1965
<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel., 1807
<i>Molopospermum peleponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824
<i>Moraea sisyrinchium</i> (L.) Ker Gawl., 1805
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809
<i>Myosotis speluncicola</i> (Schott ex Boiss.) Rouy, 1881
<i>Myriolimon diffusum</i> (Pourel.) Lledó, Erben & M.B.Crespo, 2005
<i>Narcissus assoanus</i> Dufour, 1830
<i>Nectaroscilla hyacinthoides</i> (L.) Parl., 1854
<i>Nerium oleander</i> L., 1753
<i>Nigella hispanica</i> var. <i>hispanica</i> L., 1753
<i>Nigella nigellastrum</i> (L.) Willk., 1880
<i>Noccea praecox</i> (Wulfen) F.K.Mey., 1973
<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass., 1825
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809
<i>Onobrychis aequidentata</i> (Sm.) d'Urv., 1822
<i>Ononis alopecuroides</i> subsp. <i>exalopecuroides</i> (G.López) Greuter & Burdet, 1989
<i>Ononis mitissima</i> L., 1753
<i>Ononis pubescens</i> L., 1771
<i>Onosma arenaria</i> subsp. <i>pyramidata</i> Braun-Blanq., 1917
<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Braun-Blanq.) P.Fourn., 1937
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch, 1837
<i>Oreomecon alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (L.) Banfi, Bartolucci, J.-M.Tison & Galasso, 2022
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753
<i>Paeonia officinalis</i> L., 1753
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> Nyman, 1878
<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter, 1997
<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753
<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris, 1837
<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H.Shing, 1994
<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>annoticum</i> (Jord. ex Burnat) Pignatti, 1969
<i>Phalaris aquatica</i> L., 1755
<i>Phalaris paradoxa</i> L., 1763
<i>Phyteuma villarsii</i> Rich.Schulz, 1904

<i>Picris rhagadioloides</i> (L.) Desf., 1804
<i>Pinguicula reichenbachiana</i> J.Schindl., 1908
<i>Plantago cornutii</i> Gouan, 1773
<i>Plantago subulata</i> var. <i>subulata</i> L., 1753
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>catalaunicum</i> (O.Bolòs & Vigo) Iamónico & Domina, 2015
<i>Polygala exilis</i> DC., 1813
<i>Polygonum romanum</i> subsp. <i>gallicum</i> (Raffaelli) Raffaelli & L.Villar, 1988
<i>Polypogon subspatheus</i> Req., 1825
<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. & Heyn, 1977
<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792
<i>Pseudorhiza pumila</i> (L.) Grande, 1925
<i>Pteris cretica</i> L., 1767
<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter, 1967
<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris, 1843
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791
<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809
<i>Quercus crenata</i> Lam., 1785
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC., 1817
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl, 1791
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau, 1857
<i>Ranunculus velutinus</i> Ten., 1825
<i>Rhaponticoides alpina</i> (L.) M.V.Agab. & Greuter, 2003
<i>Romulea arnaudii</i> Moret, 2000
<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818
<i>Romulea columnae</i> subsp. <i>columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818
<i>Romulea florentii</i> Moret, 2000
<i>Romulea rollii</i> Parl., 1860
<i>Rosa gallica</i> L., 1753
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm., 1791
<i>Saxifraga cochlearis</i> Rchb., 1832
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti, 1823
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq., 1776
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>ramosissima</i> (Loisel.) Bonnier & Layens, 1894
<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818
<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983
<i>Sedum litoreum</i> Guss., 1826

<i>Senecio doria</i> L., 1759
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir., 1789
<i>Silene italica</i> subsp. <i>salzmännii</i> Arcang., 1882
<i>Silene muscipula</i> L., 1753
<i>Silene portensis</i> L., 1753
<i>Silene sedoides</i> Poir., 1789
<i>Silene velutina</i> Pourr. ex Loisel., 1809
<i>Silene viridiflora</i> L., 1762
<i>Simethis mattiazii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984
<i>Sinapis pubescens</i> L., 1767
<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C.Presl, 1836
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817
<i>Sporobolus aculeatus</i> (L.) P.M.Peterson, 2014
<i>Sporobolus schoenoides</i> (L.) P.M.Peterson, 2014
<i>Squilla maritima</i> (L.) Steinh., 1836
<i>Stachys brachyclada</i> de Noé ex Coss., 1854
<i>Stachys maritima</i> Gouan, 1764
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq., 1893
<i>Stachys palustris</i> L., 1753
<i>Staphisagria macrosperma</i> Spach, 1838
<i>Staphisagria picta</i> subsp. <i>requienii</i> (DC.) B.Bock, 2012
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805
<i>Stipellula capensis</i> (Thunb.) Röser & Hamasha, 2012
<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss, 1770
<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik., 1792
<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825
<i>Taxus baccata</i> L., 1753
<i>Tephrosia balbisiana</i> (DC.) Holub, 1973
<i>Teucrium aristatum</i> Pérez Lara, 1889
<i>Teucrium brachyandrum</i> S.Puech, 1971
<i>Teucrium fruticans</i> L., 1753
<i>Teucrium massiliense</i> L., 1763
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>purpurascens</i> (Benth.) S.Puech, 1976
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L., 1753
<i>Thalictrum lucidum</i> L., 1753
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl., 1847
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All., 1785
<i>Thymelaea tartonraira</i> subsp. <i>tartonraira</i> (L.) All., 1785
<i>Trifolium bocconeii</i> Savi, 1808
<i>Trifolium hirtum</i> All., 1789

<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753
<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753
<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804
<i>Tulipa clusiana</i> DC., 1804
<i>Tulipa lortetii</i> Jord., 1858
<i>Tulipa raddii</i> Reboul, 1822
<i>Typha minima</i> Funck, 1794
<i>Valantia hispida</i> L., 1759
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss., 1855

<i>Veratrum nigrum</i> L., 1753
<i>Verbena supina</i> L., 1753
<i>Vicia altissima</i> Desf., 1799
<i>Vicia melanops</i> Sibth. & Sm., 1813
<i>Viola arborescens</i> L., 1753
<i>Viola jordanii</i> Hanry, 1853
<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753
<i>Xatartia scabra</i> (Lapeyr.) Meisn., 1838
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753

Annexe 2 : Liste des taxons à statut conservés en herbier par le CBNMed

Nom complet du taxon
<i>Acanthoprasium frutescens</i> (L.) Spenn., 1843
<i>Adonis vernalis</i> L., 1753
<i>Aira provincialis</i> Jord., 1852
<i>Alcea biennis</i> Winterl., 1788
<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753
<i>Allium commutatum</i> Guss., 1855
<i>Allium nigrum</i> L., 1762
<i>Allium savii</i> Parl., 1857
<i>Allium siculum</i> Ucria, 1793
<i>Allium subhirsutum</i> L., 1753
<i>Alyssum corsicum</i> Duby, 1828
<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894
<i>Anagyris foetida</i> L., 1753
<i>Andropogon distachyos</i> L., 1753
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779
<i>Androsace argentea</i> (C.F.Gaertn.) Lapeyr., 1813
<i>Anemone coronaria</i> L., 1753
<i>Anemone palmata</i> L., 1753
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv., 1806
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L., 1753
<i>Anthyllis cytisoides</i> L., 1753
<i>Antirrhinum tortuosum</i> Bosc ex Lam., 1797
<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854
<i>Arenaria cinerea</i> DC., 1815
<i>Arenaria modesta</i> Dufour, 1821
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & G.Halliday, 1964
<i>Aristolochia clusii</i> Lojac., 1907
<i>Armeria belgenciensis</i> Donad. ex Kerguelen, 1987
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godr., 1853
<i>Artemisia borealis</i> Pall., 1776
<i>Artemisia molinieri</i> Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966
<i>Arundo micrantha</i> Lam., 1791
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill., 1768
<i>Asperula laevigata</i> L., 1767
<i>Asperula taurina</i> L., 1753

<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy, 1913
<i>Asplenium sagittatum</i> (DC.) Bange, 1952
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753
<i>Astragalus echinatus</i> Murray, 1770
<i>Astragalus terraccianoii</i> Vals., 1994
<i>Atractylis cancellata</i> L., 1753
<i>Bassia laniflora</i> (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978
<i>Berardia lanuginosa</i> (Lam.) Fiori, 1904
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord., 1864
<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753
<i>Bupleurum semicompositum</i> L., 1756
<i>Campanula albicans</i> (Buser) Engl., 1897
<i>Cardamine plumieri</i> Vill., 1779
<i>Carduus acicularis</i> Bertol., 1829
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr, 1801
<i>Carex bicolor</i> All., 1785
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787
<i>Carex depressa</i> Link, 1800
<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781
<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr, 1806
<i>Carex grioletii</i> Roem., 1806
<i>Carex limosa</i> L., 1753
<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840
<i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803
<i>Carex mucronata</i> All., 1785
<i>Carex olbiensis</i> Jord., 1846
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753
<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811
<i>Carex remota</i> L., 1755
<i>Carthamus caeruleus</i> L., 1753
<i>Cephalaria transylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
<i>Cerastium alpinum</i> L., 1753
<i>Cerastium siculum</i> Guss., 1832
<i>Chaerophyllum nodosum</i> (L.) Crantz, 1767
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753
<i>Cistus crispus</i> L., 1753
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng, 1934

<i>Cneorum tricocon</i> L., 1753
<i>Colchicum cupanii</i> Guss., 1827
<i>Colchicum filifolium</i> (Cambess.) Stef., 1926
<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr., 1792
<i>Convolvulus lineatus</i> L., 1759
<i>Convolvulus sicalus</i> L., 1753
<i>Coronilla securidaca</i> L., 1753
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr., 1788
<i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier, 1923
<i>Crepis dioscoridis</i> L., 1763
<i>Cressa cretica</i> L., 1753
<i>Crocus ligusticus</i> Mariotti, 1988
<i>Crucianella maritima</i> L., 1753
<i>Cyclamen repandum</i> Sm., 1806
<i>Cyperus capitatus</i> Vand., 1771
<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm., 1866
<i>Damasonium polyspermum</i> Coss., 1849
<i>Danthonia alpina</i> Vest, 1821
<i>Daphne striata</i> Tratt., 1814
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1801
<i>Dictamnus albus</i> L., 1753
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik., 1790
<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753
<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss., 1840
<i>Draba nemorosa</i> L., 1753
<i>Elatine macropoda</i> Guss., 1827
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski, 1936
<i>Ephedra major</i> Host, 1831
<i>Erodium foetidum</i> (L.) L'Hér., 1802
<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753
<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill., 1786
<i>Euphorbia terracina</i> L., 1762
<i>Facchinia lanceolata</i> (All.) Rchb., 1841
<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu, 1898
<i>Fritillaria moggridgei</i> Baker, 1879
<i>Fritillaria montana</i> Hoppe, 1832
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829
<i>Gagea lacaitae</i> A.Terracc., 1904
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl., 1816
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827
<i>Gagea reverchonii</i> Degen, 1903

<i>Gagea soleirolii</i> F.W.Schultz, 1836
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826
<i>Galium minutulum</i> Jord., 1846
<i>Galium verrucosum</i> Huds., 1767
<i>Genista linifolia</i> L., 1762
<i>Genista lobelii</i> DC., 1805
<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet, 1956
<i>Gladiolus dubius</i> Guss., 1832
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753
<i>Hedysarum spinosissimum</i> L., 1753
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill., 1768
<i>Helianthemum marifolium</i> Mill., 1768
<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum.Cours., 1802
<i>Heliotropium supinum</i> L., 1753
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753
<i>Hormathophylla lapeyrouseana</i> (Jord.) P.Küpfer, 1974
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm., 1944
<i>Hyoseris scabra</i> L., 1753
<i>Iberis nana</i> All., 1789
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch., 1797
<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763
<i>Inula britannica</i> L., 1753
<i>Inula helenioides</i> DC., 1815
<i>Iris xiphium</i> L., 1753
<i>Isoetes durieui</i> Bory, 1844
<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844
<i>Isoetes lacustris</i> L., 1753
<i>Juncus arcticus</i> Willd., 1799
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC., 1838
<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897
<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf., 1892
<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill., 1916
<i>Leucojum pulchellum</i> Salisb., 1807
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill., 1768
<i>Limonium cuspidatum</i> (Delort) Erben, 1978
<i>Limonium girardianum</i> (Guss.) Fourr., 1869
<i>Limonium pseudominutum</i> Erben, 1988
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf., 1799
<i>Linum viscosum</i> L., 1762
<i>Loeflingia hispanica</i> L., 1753
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot., 1800

<i>Lunaria rediviva</i> L., 1753
<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753
<i>Lythrum borysthenticum</i> (Schrank) Litv., 1917
<i>Lythrum thymifolia</i> L., 1753
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878
<i>Marsilea strigosa</i> Willd., 1810
<i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire, 1932
<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) W.T.Aiton, 1812
<i>Matthiola valesiaca</i> J.Gay ex Boiss., 1867
<i>Medicago secundiflora</i> Durieu, 1845
<i>Melilotus messanensis</i> (L.) All., 1785
<i>Mentha cervina</i> L., 1753
<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb., 1831
<i>Milium montianum</i> Parl., 1850
<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel., 1807
<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Asch., 1885
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809
<i>Myosotis speluncicola</i> (Schott ex Boiss.) Rouy, 1881
<i>Nerium oleander</i> L., 1753
<i>Nigella nigellastrum</i> (L.) Willk., 1880
<i>Nonea pulla</i> (L.) DC., 1805
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809
<i>Nymphaea alba</i> L., 1753
<i>Onobrychis aequidentata</i> (Sm.) d'Urv., 1822
<i>Ononis mitissima</i> L., 1753
<i>Ononis pubescens</i> L., 1771
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806
<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter, 1997
<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753
<i>Phalaris aquatica</i> L., 1755
<i>Phalaris paradoxa</i> L., 1763
<i>Pinus mugo</i> Turra, 1764
<i>Plantago cornutii</i> Gouan, 1773
<i>Polygala exilis</i> DC., 1813
<i>Polygonum debeauxii</i> Le Grand, 1883
<i>Polypogon subspathaceus</i> Req., 1825
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804

<i>Potentilla alba</i> L., 1753
<i>Primula allionii</i> Loisel., 1809
<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792
<i>Primula pedemontana</i> E.Thomas ex Gaudin, 1828
<i>Pteris cretica</i> L., 1767
<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris, 1843
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791
<i>Quercus crenata</i> Lam., 1785
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC., 1817
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789
<i>Ranunculus revelierei</i> Boreau, 1857
<i>Romulea arnaudii</i> Moret, 2000
<i>Romulea florentii</i> Moret, 2000
<i>Romulea rollii</i> Parl., 1860
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821
<i>Ruppia maritima</i> L., 1753
<i>Salix helvetica</i> Vill., 1789
<i>Salix laggeri</i> Wimm., 1854
<i>Saxifraga cochlearis</i> Rchb., 1832
<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi, 1792
<i>Saxifraga valdensis</i> DC., 1815
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq., 1776
<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983
<i>Sedum litoreum</i> Guss., 1826
<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring, 1838
<i>Senecio doria</i> L., 1759
<i>Serapias neglecta</i> De Not., 1844
<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837
<i>Silene muscipula</i> L., 1753
<i>Silene sedoides</i> Poir., 1789
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984
<i>Stachys brachyclada</i> de Noé ex Coss., 1854
<i>Stachys maritima</i> Gouan, 1764
<i>Stachys palustris</i> L., 1753
<i>Staphisagria macrosperma</i> Spach, 1838
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805
<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik., 1792
<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825
<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789
<i>Tephrosia balbisiana</i> (DC.) Holub, 1973
<i>Teucrium brachyandrum</i> S.Puech, 1971
<i>Teucrium fruticans</i> L., 1753

<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L., 1753
<i>Thalictrum tuberosum</i> L., 1753
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl., 1847
<i>Tozzia alpina</i> L., 1753
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell., 1921
<i>Trifolium leucanthum</i> M.Bieb., 1808
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753
<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq., 1767
<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753
<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804
<i>Tulipa lortetii</i> Jord., 1858
<i>Typha laxmannii</i> Lepech., 1801
<i>Typha minima</i> Funck, 1794
<i>Valantia hispida</i> L., 1759
<i>Vallisneria spiralis</i> L., 1753
<i>Verbena supina</i> L., 1753
<i>Vicia altissima</i> Desf., 1799
<i>Viola arborescens</i> L., 1753
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm., 1793
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753
<i>Zannichellia pedunculata</i> Rchb., 1829
<i>Zannichellia peltata</i> Bertol., 1855
<i>Althenia filiformis</i> subsp. <i>filiformis</i> Petit, 1829
<i>Armeria ruscinonensis</i> subsp. <i>ruscinonensis</i> Girard, 1844
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>bilotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>obovatum</i> Viv., 1824
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) Heywood, 1964
<i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>distachya</i> L., 1753
<i>Hedysarum boveanum</i> subsp. <i>europaeum</i> Guitt. & Kerguelen, 1991
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> (Roth) G.Don, 1830
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>serotinum</i> (Boiss.) P.Fourn., 1939
<i>Micromeria graeca</i> subsp. <i>graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb., 1831
<i>Milium vernale</i> subsp. <i>scabrum</i> (Rich.) K.Richt., 1890
<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>annoticum</i> (Jord. ex Burnat) Pignatti, 1969

<i>Polygonum romanum</i> subsp. <i>gallicum</i> (Raffaelli) Raffaelli & L.Villar, 1988
<i>Romulea columnae</i> subsp. <i>columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>ramosissima</i> (Loisel.) Bonnier & Layens, 1894
<i>Silene italica</i> subsp. <i>salzmannii</i> Arcang., 1882
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>purpurascens</i> (Benth.) S.Puech, 1976
<i>Thymelaea tartonraira</i> subsp. <i>thomasii</i> (Duby) Arcang., 1882
<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925
<i>Isoetes longissima</i> Bory, 1844
<i>Alyssum flexicaule</i> Jord., 1846
<i>Trifolium bocconeii</i> Savi, 1808
<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H.Shing, 1994
<i>Picris rhagadioloides</i> (L.) Desf., 1804
<i>Cutandia maritima</i> (L.) Benth., 1881
<i>Anthyllis circinnata</i> (L.) D.D.Sokoloff, 2003
<i>Chiladenus glutinosus</i> (L.) Fourr., 1869
<i>Ionopsidium glastifolium</i> (L.) M.Koch, 2012
<i>Myriolimon diffusum</i> (Pourr.) Lledó, Erben & M.B.Crespo, 2005
<i>Dichoropetalum schottii</i> (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov, 2007
<i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961
<i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M.Monts., 2005
<i>Neoschischkinia pourretii</i> (Willd.) Valdés & H.Scholz, 2006
<i>Staphisagria picta</i> subsp. <i>requienii</i> (DC.) B.Bock, 2012
<i>Nigella hispanica</i> var. <i>hispanica</i> L., 1753
<i>Arundo donaciformis</i> (Loisel.) Hardion, Verlaque & B.Vila, 2012
<i>Biserrula epiglottis</i> (L.) Coulot, P.Rabaute & J.-M.Tison, 2014
<i>Stipellula capensis</i> (Thunb.) Röser & Hamasha, 2012
<i>Asplenium foreziense</i> Le Grand ex Magnier, 1884
<i>Bellevalia romana</i> (L.) Sweet, 1826
<i>Oeosporangium hispanicum</i> (Mett.) Fraser-Jenk. & Pariyar, 2016
<i>Hormathophylla saxigena</i> (Jord. & Fourr.) D.A.German & Govaerts, 2015
<i>Hormathophylla ligustica</i> (Breistr.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold, 2015

<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>permixta</i> (Jord.) L.Cecchi & Selvi, 2014
<i>Aiopsis tenella</i> (Cav.) Coss. & Durieu, 1855
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>catalaunicum</i> (O.Bolòs & Vigo) Iamónico & Domina, 2015
<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>minor</i> (Duby) Wilczek, 1917
<i>Sporobolus aculeatus</i> (L.) P.M.Peterson, 2014
<i>Sporobolus schoenoides</i> (L.) P.M.Peterson, 2014



Contact

Siège
34 avenue Gambetta
83400 Hyères
04 94 16 61 40
contact@cbnmed.fr

**Antenne Occitanie -
Languedoc-Roussillon**
Agropolis International
1000 Avenue Agropolis
34090 MONTPELLIER

04 94 16 61 40

**Antenne Alpes-
Maritimes**
Villa Thuret
90 chemin Raymond
06 160 Antibes
04 92 38 64 74

Rédaction : Lara DIXON – Chargée de mission conservation

Mots-clés :

Demande de dérogation ; espèces protégées ; missions.

Référence bibliographique :

DIXON L., 2025. Demande de dérogation espèces protégées. Conservatoire botanique national méditerranéen. 12 pages + annexes.

Date de réalisation : Juillet 2025

Photographie de couverture : Julie RAVERA.